



FICHA TÉCNICA

USO EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA Y CONVENCIONAL
MEJORADOR DE SUELO SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA.

Licor de Cítricos	47.2 %
Extractos derivados de Cítricos	2.4 %
Roca fosfórica	9.4 %
Humus líquido como diluyente	35.4 %
Ácidos fúlvicos	5.6 %

Contiene:

185 g i.a./L a 20 °C

INFORMACIÓN GENERAL.

Actúa como mejorador de suelo y enraizador. Induce la bioestimulación radicular y la actividad microbiana del suelo. Favorece a la proliferación de microorganismos benéficos en el suelo, aumenta la fertilidad del suelo y la colonización de microorganismos simbióticos, favorece la biodisponibilidad de nutrientes en el suelo y aumenta la porosidad del suelo.

RECOMENDACIONES DE USO.

Cultivo	Vía Drench o Riego
---------	--------------------

Cítricos	Diluir 30 ml/L de agua y aplicar:
	• 1 L/ árbol adulto.
	• 0.5 L/ árbol menor a 6 meses.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agitar perfectamente el envase antes de usar el producto, medir la dosis recomendada, verter en una cubeta con agua y mezclar. Posteriormente

agregar el contenido de la cubeta al tanque de aplicación o mochila y agitar nuevamente. Realizar aplicaciones con intervalos de 30 días, realizar las aplicaciones por la mañana o tarde, cuidando que el suelo contenga humedad óptima según el cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use el equipo de protección adecuado para manipular este producto, por ejemplo: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, guantes, goggles y botas. Durante la preparación y aplicación, hágalo a favor del viento; evite el contacto con los ojos y la piel. Después de manejar y aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta antes de volver a usarla.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda MultiRoot-Fulvi en mezclas, si se desea mezclar es necesario realizar pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad previas a la aplicación.

ALMACENAMIENTO.

No requiere de condiciones especiales para su almacenamiento, pero por ser un producto de origen natural y fermentativo, puede formar compuestos aromáticos y de gasificación. Se mantiene en óptimas condiciones aún en temperaturas de 35°C, se sugiere aplicarse antes de dos años.